DIETAN

Popis: Bylinný přípravek, který se používá jako součást protiprůjmových opatření vzniklých při chybách ve výživě zvířat. Přípravek působí antisepticky v trávícím traktu, ochraňuje střevní sliznici a zabraňuje vstřebávání škodlivých látek.
Hlavními účinnými složkami jsou heřmánek a dubová kůra. Aktivními látkami heřmánku jsou silice, které působí jako antiflogistikum a spasmolytikum, **účinné jsou i proti nadýmání.** Dubová kůra obsahuje množství tříslovin, které působí svíravě a mají **protizánětlivé účinky.**
Použití:
Uvedené množství přípravku zamíchejte do denní dávky krmiva. Používá se jako součást protiprůjmových opatření při dietetických chybách.
Dávkování:
Pes a kočka: 50 mg přípravku/kg ž.hm.(1/4 káv. lžičky/5 kg ž.hm.) Podávat do vymizení příznaků.
Králíci: 0,35 -0,75g/ks/den (1/3-1/2 káv.lžičky). Podávat 2-3 týdny po odstavu.
Drůbež: 1 čajová lžička přípravku na 10 ks nebo 50-70 g/100 l pitné vody. Podávat po dobu 5-7 dní.

Balení: **120 g, 1 kg, 5 kg**

UNIVIT s.r.o., Na vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, tel.:+420 585 547 587
univit@univit.cz, www.univit.cz

Dávkování:
Telata, skot: 0,2 g/kg ž.hm./den. Podávat 3-4 dny.
Přípravek se rozmíchá v teplé vodě a podává se 2x denně (ráno a večer) samostatně nebo zamíchaný v krmivu.

Odstavená selata: 0,2 -0,3g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 21 dní. Aplikovat 5 dní před odstavem.

Výkrm prasat: 0,2 -0,3g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 10 dní.

Pozn.:
1 vrchovatá polévková lžíce - cca 11 g přípravku
1 zarovnaná polévková lžíce - cca 6 g přípravku
1 vrchovatá kávová lžička - cca 4 g přípravku

Složení přípravku:
Dubová kůra
Heřmánek
Salicylan sodný
Cukr